

靜脈麻醉

一、靜脈麻醉應用在 5 至 30 分鐘的手術，以靜脈安眠劑及止痛劑讓患者失去知覺，無痛下進行檢查或手術。準備工作如全身麻醉之準備工作，不同於全身麻醉是不需肌肉鬆弛劑及氣管插管，而僅以面罩維持氣道通暢。

二、麻醉風險

對於部份接受麻醉之病人而言，無論是全身麻醉、區域麻醉或靜脈麻醉，均有可能會發生副作用或是併發症，嚴重者甚至可能死亡，這種因麻醉而來的危險與您身體狀況有關。根據美國麻醉醫學會所制定的標準可分為以下等級：

第一級：正常、健康。(手術麻醉死亡率為 0.06-0.08%)

第二級：有輕微的全身性疾病，但無功能上的障礙。(手術麻醉死亡率為 0.27-0.4%)

第三級：有中度至重度的全身性疾病且造成部份的功能障礙。(手術麻醉死亡率為 1.8-4.3%)

第四級：有重度全身性疾病，具有相當的功能障礙且時常危及生命。(手術麻醉死亡率為 7.8-23%)

第五級：瀕危狀態，不管有無手術預期在 24 小時內死亡。(手術麻醉死亡率為 9.4-51%)

麻 醉 科 人 員 在 手 術 室 陪 伴 您